

Banque CCINP : 13, 41 Q1).

Valeurs d'adhérence

Exercice 1 (Suites réelles, limite supérieure, limite inférieure). a) Donner un exemple d'une suite réelle (u_n) ayant une unique v.a. dans \mathbb{R} mais qui ne converge pas.

b) Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite bornée. On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les suites $u_n^+ = \sup\{u_k, k \geq n\}$ et $u_n^- = \inf\{u_k, k \geq n\}$.

(i) Montrer que les deux suites (u_n^+) et (u_n^-) sont convergentes. On note $L = \lim u_n^+$ et $l = \lim u_n^-$.

(ii) (Plus difficile) Montrer que L et l sont deux valeurs d'adhérences de (u_n) .

(On pourra utiliser la caractérisation : λ est v.a. ssi « tout voisinage de λ est atteint une infinité de fois ».)

(iii) Montrer que toute valeur d'adhérence λ de (u_n) est comprise entre l et L .

Indication – on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^- \leq u_n \leq u_n^+$.

Exercice 2. Soit $(a_n), (b_n), (c_n)$ trois suites réelles telles que $a_n + b_n + c_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et $e^{a_n} + e^{b_n} + e^{c_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 3$. Montrer que ces suites convergent et préciser leurs limites.

Exemples de compacts ou pas

Exercice 3 (Dans \mathbb{R}^2). Soit $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$ et $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 - y^2 = 1\}$.

Est-ce que E_1 (resp. E_2) est compact ?

La préimage d'un compact par une fonction continue est-elle un compact ?

Exercice 4 (Dans $M_n(\mathbb{K})$). Les sous-ensembles suivants de $M_n(\mathbb{K})$ sont-ils compacts :

(i) $GL_n(\mathbb{K})$ (ii) $\{A \in M_n(\mathbb{K}), \|A\| = 1\}$ (où $\|\cdot\|$ est une norme quelconque fixée sur A , (iii) l'ensemble des matrices nilpotentes ?

Exercice 5. La réunion (resp. l'intersection) de deux compacts d'un e.v.n. E est-elle encore un compact de E ?

Exercice 6 (Théorème des compacts emboités : intersection décroissante de compacts).

a) Soit $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille décroissante de compacts non vides d'un e.v.n. $(E, \|\cdot\|)$ i.e. telle que $\forall n \in \mathbb{N}, K_{n+1} \subset K_n$.

Montrer que $K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est encore non vide et compact.

On pourra considérer une suite (x_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in K_n$.

b) Si A est une partie non vide bornée de E , justifier que son diamètre :

$$\delta(A) = \sup\{\|a - b\|, (a, b) \in A^2\}$$

est bien défini.

c) On reprend les hypothèses du a) et on suppose en outre que $\delta(K_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Que dire alors de $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$?

Fonctions continues sur un compact

Exercice 7. Pour toute $A \in M_n(\mathbb{K})$, on note $\|A\| = \max_{(i,j) \in [1,n]} |a_{i,j}|$ la norme infinie de A .

Montrer qu'il existe une constante C_n qui ne dépend que de n telle que :

$$\forall A \in M_n(\mathbb{K}), |\det(A)| \leq C_n \|A\|^n$$

Exercice 8 (Distances atteintes ou pas). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. A une partie de E et $x \in E$.

- a) Définir la distance de x à A .
- b) (i) Montrer que si A est compact alors il existe un $a \in A$ tel que $d(x, A) = \|x - a\|$.
(ii) Montrer que si E est de dim. finie et A est fermé alors il existe un $a \in A$ tel que $d(x, A) = \|x - a\|$.
- c) Si A et B sont deux parties de E , définir la distance $d(A, B)$ entre ces deux parties.
- d) Donner un exemple de deux parties fermées A et B de \mathbb{R} ou de \mathbb{R}^2 telles que $d(A, B) = 0$ et $A \cap B = \emptyset$.
Indication – Je te colle mais je ne touche pas...en grec cela se dit...
- e) Montrer que si A est compact dans E et B est une partie fermée de E et que E est de dimension finie alors il existe une couple $(a, b) \in A \times B$ tel que $d(A, B) = \|a - b\|$.

Exercice 9 (Bijectivité des isométries d'un compact).

- a) Soit K un compact d'un e.v.n. et $f : K \rightarrow K$ une application isométrique i.e. telle que $\forall (x, y) \in K^2$, $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$

On veut montrer que f est automatiquement *surjective*.

Pour cela :

- on fixe un $x_0 \in K$, et on considère la suite $(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ définie par $n \geq 1$, $x_{n+1} = f(x_n)$ montrer que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un élément $x_n \in f(K)$ tel que $\|x_0 - x_n\| < \varepsilon$ et donc que $f(K)$ est dense dans K .
- Conclure que $f(K) = K$.

- b) Donner un exemple d'un sous-ensemble F d'un e.v.n. avec une isométrie $f : F \rightarrow F$ non surjective.

Obtenir des max et de min sans compacité au départ (compacité locale + limites)

Exercice 10 (Fonctions coercives : généralisation d'un exercice connu dans \mathbb{R}). Soient E un e.v.n. de dim. finie et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(x) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$ (on dit que f est coercive).

Montrer que f admet un minimum global sur E .

Exercice 11 (Avec ou sans le précédent... important). Soit E un e.v.n. qcq et F un s.e.v. de dim. finie de E . Soit $a \in E$. On note $d(a, F) = \inf\{\|a - v\|, v \in F\}$.

Montrer que cet inf. est atteint i.e. il existe un $v_0 \in F$ tel que $\|a - v_0\| = d(a, F)$.

Suites de fonctions définies sur un compact

Exercice 12 (Théorème de Dini : avec intersection décroissantes de compacts). Soit K un compact d'un e.v.n. $(f_n) \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur K .

On suppose que la suite (f_n) est décroissante, ce qui signifie que pour chaque $x \in K$ fixé, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$.

- a) On suppose que (f_n) converge simplement vers la fonction nulle. On va montrer que la convergence est uniforme.

On fixe un $\varepsilon > 0$. Pour chaque n , on pose :

$$K_n = \{x \in K, f_n(x) \geq \varepsilon\}$$

- Montrer que K_n est un compact.
- Conclure en considérant $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

- b) On suppose maintenant que (f_n) CVS vers une fonction *continue* f . Montrer encore que la convergence est uniforme grâce au a).

Connexité par arc

Exercice 13. a) Justifier que $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ d'un côté et $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ de l'autre ne sont pas homéomorphes.

b) En déduire que \mathbb{R} et \mathbb{R}^2 ne sont pas homéomorphes.

Exercice 14. Montrer un produit de deux parties connexes par arc est connexe par arc.

Exercice 15. Montrer qu'il n'existe pas d'homéomorphisme envoyant la lettre I sur la lettre O , ni d'homéo entre O et B .

Exercice 16.

- Soit I un intervalle réel et f de classe $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.
- Donner un exemple de fonction dérivable qui n'est pas de classe \mathcal{C}^1 .
- Soit I un intervalle réel. Montrer que l'ensemble $C = \{(x, y) \in I^2, x < y\}$ est connexe par arcs.
- Théorème de Darboux :** Soit I un intervalle réel et f une fonction dérivable sur I . Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

Indication fournie par l'examinateur pendant l'épreuve pour le d) :

Soit $\tau : (x, y) \mapsto \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$, montrer que $\tau(C) \subset f'(I) \subset \overline{\tau(C)}$